


Профилактика клещевого энцефалита

Меры профилактики

Вакцинация

- привитое лицо – лицо, получившее законченный курс вакцинации + одну (или более) ревакцинацию
- на потенциально опасных территориях массовую вакцинопрофилактику рекомендуется начинать с 4-летнего возраста
- вакцинацию начинают за 1,5 месяца до выезда на местность
- прививка состоит из двух инъекций, минимальный интервал между ними – один месяц
- после последней инъекции должно пройти не менее двух недель, прежде чем выработается иммунитет
- ревакцинация проводится через год и состоит только из одной инъекции
- повторяют ревакцинацию каждые три года

Требования к одежде



Противоклещевые средства защиты

акарицидные средства






репеллентные средства






На природе

Находясь в лесу, парке, садовом участке и т. д., важно соблюдать меры предосторожности (п. 8.3.1 Санитарных правил)




Работа на открытом воздухе

Если пребывание на природе связано с выполнением работы, на работодателя накладывается ряд обязанностей (п. 10.4.1-10.4.7 Санитарных правил, ст. 212 ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития России от 25 апреля 2011 г. № 340н)



Обратите внимание!

Часто путают клеща и лосиног клеща, который, попав на тело, сбрасывает крылья. Лосиный клещ (вошь, муха) – это паразит, который питается исключительно кровью теплокровных животных. Он не является переносчиком энцефалита.



Если укус все же произошел

Обратиться в медучреждение






Обратиться за медицинской помощью следует немедленно (желательно в ближайшие 1-2 дня); в медучреждении удалят клеща и отправят его на исследование.
Лицам:

- непривитым против клещевого вирусного энцефалита,
- получившим неполный курс прививок,
- имеющим дефекты в вакцинальном курсе,
- не имеющим документального подтверждения о профилактических прививках

в течение первых четырех дней после укуса проводят экстренную профилактику (введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита).

Если нет возможности обратиться в медучреждение




Можно извлечь клеща своими силами, соблюдая меры предосторожности.



Живого клеща желательно в ближайшие сутки-двое доставить на исследование в региональный филиал микробиологической лаборатории ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" или иные лаборатории, проводящие такие исследования. Стоимость исследования одного клеща в среднем составляет 1 тыс. руб.

Признаки заболевания

Инкубационный период длится, как правило, 10-14 дней; болезнь начинается остро, сопровождается:



Последствия заболевания

- длительные головные боли и головокружение
- менингит
- нарушение слуха, речи, зрения
- нарушение координации работы мышц, параличи
- ослабление памяти
- быстрая утомляемость, слабость
- умственная отсталость
- изменение личности (расщепление сознания, галлюцинации, нервность)
- аффективные расстройства психики и др.

